



CANTACK®

1 L

Toelatingsnr. 12939 N

Spintbestrijdingsmiddel



Beschrijving van de eerste hulpmatregelen
Algemeen advies: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Onder medisch toezicht houden gedurende tenminste 48 uur.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

Aanraking met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlens pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Bij aanhoudende oogirritatie of roodheid een oogarts opzoeken.

Inslukken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschinselen: Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling: Symptomatisch behandelen. Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als een grotere hoeveelheid ingeslikt is, medicinale houtskool en natrium-sulfaat geven. Een specifiek tegengif is niet bekend. Onder medisch toezicht houden gedurende tenminste 48 uur.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als spint-bestrijdingsmiddel:

- a. in de onbedekte vermeerderingsteelt van aardbeien;
- b. in de bedekte en onbedekte teelt van bloemisteriegewassen;
- c. in de bedekte en onbedekte teelt van boomkwekeriegewassen, vaste planten en openbaar groen.

Voor opwaartse veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daarboven geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheids-effecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Resistentiemanagement

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die acequinoïyl bevatten niet vaker gebruiken dan 9 maal per kalenderjaar, verdeeld over drie blokbekledingen. Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen
Cantack bevat als werkzame stof acequinoïyl en behoort tot een nieuwe groep van acariciden.

Cantack is zowel werkzaam tegen eieren als tegen alle beweeglijke stadia van spintmijten.

Resistentiemanagement

Cantack niet vaker toepassen dan 3 blokbekledingen per kalenderjaar (een blokbekleding bestaat uit 2 of 3 bespuitingen met een interval van dagen).
Een blokbekleding met Cantack steeds afwisselen met een blokbekleding op basis van een middel uit een andere chemische groep. Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.

Toepassingen

In de onbedekte vermeerderingsteelt van aardbeien,
ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychus spp.*). Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel d.m.v. een gewasbespuiting te worden toegepast. De behandeling na 7 tot 10 dagen herhalen.
Dosering: 0,1% of 100 ml middel per 100 liter water

In de bedekte en onbedekte teelt van bloemisteriegewassen, ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychus spp.*) (zie ook Gevoeligheid gewassen).
Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel d.m.v. een gewasbespuiting te worden toegepast. De behandeling na 7 tot 10 dagen herhalen.
Dosering: 0,1% of 100 ml middel per 100 liter water

In de bedekte en onbedekte teelt van boomkwekeriegewassen, vaste planten en openbaar groen, ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychus spp.*).
Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel d.m.v. een gewasbespuiting te worden toegepast. De behandeling na 7 tot 10 dagen herhalen.
Dosering: 0,1% of 100 ml middel per 100 liter water

Gevoeligheid gewassen
Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloemisteriegewassen, boomkwekeriegewassen en vaste planten is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel dient eerst een proefbespuiting te worden uitgevoerd om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Bloemisteriegewassen in bedekte teelten
In de teelt van rozen, ficus en potroos kan, afhankelijk van de cultivar, gewasreactie optreden.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding in bedekte teelten:
Na een gewas- of ruimbekleding uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Voorkomen emissie:
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater

te voorkomen, adviseert Bayer CropScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespuiten perceel kunnen worden uitgedrensd in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieu-belasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

ARTIKELNR.: 05447169

Productnaam: Cantack
Toelatingsnummer: 12939 N – W2
Aard van het preparaat: suspensie concentraat
Werkzame stoffen: acequinoïyl
Gehalte: 150 g/l

Geveerenaanduidingen:
Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen
Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen
Bevat chloorthaloniol, acequinoïyl. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.
Droog, koel en achter slot bewaren.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Bewaren boven -5°C

Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar
www.dresscode.bayer.nl

STOR: Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie



Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.

De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering, etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.



WAARSCHUWING

IN GEVAL VAN NOOD:
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30- 274 8888
In overige gevallen Bayer:
Binnen kantooruren: +31 (0)297-290307
Buiten kantooruren: +31 (0)6- 553 724 90

NL00112939H



Chargennummer: zie elders op de verpakking
© is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-260358

Bayer