



11E[®] Olie

20 L

Toelatingsnr: 5952 N

Olie ter voorkoming van virusoverdracht en insectenbestrijding

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Zo mogelijk, de informatie op verpakking of label bij contactopname met vergiftigingsinformatiecentrum of arts of voor de behandeling meenemen.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Vuile kleding en schoenen bij hergebruik schoon maken of weggoaien, als ze niet meer grondig schoon gemaakt kunnen worden.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslikken: Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen. Bij braken na inslikken bestaat er gevaar voor binnendringen van het product in de longen. Mond spoelen en geactiveerde kool innemen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Slachtoffer warm en rustig houden.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Verschijnselen: Misselijkheid, Duizeligheid, Hoofdpijn, Somnolentie, Maag- en darm-irritaties, Braken, Diarree, Aspiratie kan longoedeem en longontsteking ontstaan, Ademhalingsmoeilijkheden

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als een grotere hoeveelheid ingeslikt is, medicinale houtskool en natrium-sulfaat geven. In het geval van verslikken intubatie en bronchiaal spoeling overwegen. Behandel symptomatisch en op de patient toegesneden.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:

- insecticide ter voorkoming van de overdracht van nonpersistente virussen door bladluizen in de teelt van bloembolgewassen en pootaardappelen;
- insectenbestrijdingsmiddel in de teelt in de volleggrond van appels, peren en pruimen. Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van appels, peren en pruimen als insecticiden uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater
 - maximaal éénmaal per seizoen wordt toegepast, en
 - gespoten wordt met een maximaal watervolume van 1000 L/ha, en
 - in de periode voor of na 1 mei gebruik wordt gemaakt van één van de onderstaande drift reducerende maatregelen:

Vóór 1 mei (kaal)

- Tunnelspuit, of
- Venturidop + éénzijdige bespuiting laatste bomenrij; ventilatorstand laag of uit

Na 1 mei (volblad)

- Tunnelspuit, of
- Combinatie windhaag op de rand van het rijpad en éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij, of
- Sensorgestuurde bespuiting, of
- Emissiescherm (2,5 m hoog), of
- Dwarssroomspruit met reflectiescherm, of
- 6 meter teeltvrije zone, of
- Venturidop + éénzijdige bespuiting laatste bomenrij; ventilator aan.
- Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwitarthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

GEBRUIKSAANWIJZING

a. Voorkoming overdracht van non-persistente virussen Lelies

Door gewasbespuitingen met het middel wordt de verspreiding van tulpenmozaiekvirus en symptoomloos lelievirus (praktijknaam: lelielatentvirus) tegengegaan. **Dosering:** 15 liter per ha. In mei, juni en juli de bespuiting wekelijks uitvoeren en in augustus/september om de 10 dagen.

Tulpen

Door gewasbespuitingen met het middel wordt de verspreiding van tulpenmozaiekvirus tegengegaan. **Dosering:** 15 liter per ha. Van de eerste week in mei tot half juni wekelijks een bespuiting uitvoeren.

Hyacinten

Door gewasbespuitingen met het middel wordt de verspreiding van hyacinte-mozaiekvirus tegengegaan. Deze behandeling kan vooral worden aanbevolen in de teelt van werkbollen en van plujs, alsmede op cultivars die moeilijk "groen" te telen zijn. De behandeling wordt ontraden op cultivars die gevoelig zijn voor geelziek en op partijen waarin tijdens de bewaring geelzieke bollen zijn gevonden of waarin tijdens het voorjaar geelziek is aangetroffen. **Dosering:** 15 liter per ha. Vanaf de eerste week in mei tot 10 dagen voor het roeien wekelijks een bespuiting uitvoeren. Opmerkingen met betrekking tot toepassing in bloembolgewassen ter voorkoming van verspreiding van non-persistente virussen:

- de behandeling uitvoeren op een droog gewas, bij voorkeur tegen de avond bij bewolkte hemel;
- opbrengstderivaten tengevolge van de bespuitingen zijn mogelijk;
- menging met vuurbestrijdingsmiddelen is mogelijk;
- menging met andere merken olie wordt ontraden.

Pootaardappelen

Ter vermindering van de overdracht van non-persistente virussen in pootaardappelen. Om virusinfectie van het gewas te verminderen kan het loof vanaf de opkomst tot een week voor het doodspuiten of looftrekken regelmatig worden bespoten.

Toepassingen:

- 1e bespuiting: zodra ongeveer 50% van de planten is opgekomen.
- 2e bespuiting: 3 à 4 dagen na de eerste bespuiting.
- 3e en volgende bespuitingen: wekelijks herhalen tot één week voor het doodspuiten of looftrekken.
- Dosering:** 15 liter 11 E Olie per ha; hoeveelheid spuitvloeistof: 400-600 liter per ha.

N.B.:

- De behandeling uitvoeren op een droog gewas, bij voorkeur tegen de avond bij bewolkte hemel.
- Er dient rekening te worden gehouden met opbrengstderivaten tengevolge van de bespuitingen. De mate waarin deze bij verschillende rassen kan optreden is onvoldoende bekend.
- Middelen ter bestrijding van Phytophthora moeten afzonderlijk worden toegepast. Gebruik echter geen tin- of koperbevattende middelen in verband met kans op ernstige bladverbranding.
- Gebruik ook geen combinatie van insecticiden en 11 E Olie; een combinatie van synthetische pyrethroiden met 11 E Olie is echter wel mogelijk.

b. Vollegrondsteelten van appels, peren en pruimen, voor het doden van eieren van wantsen.

In het gevorderde muizenoorstadium een behandeling uitvoeren bij windstil weer op droge bomen en als droog weer wordt verwacht. Er bestaat kans op bladbeschadiging, vooral als na de bespuiting nachtvorst optreedt. **Dosering:** 3% (3 liter middel per 100 liter water).

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

ARTIKEL-NR.: 04307096

Aard van het preparaat: vloeistof

Werkzame stof: minerale olie

Gehalte: 850 gram per liter

Toelatingsnummer: 5952N - W8

Professioneel gebruik

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: minerale olie.

Gevenaanduidingen

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**.)

GEEN braken opwekken.

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval: Zie STORL.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Droog, koel en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Vorstvrij bewaren.

Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat, ga naar

www.dresscode.bayercropscience.nl

STORL

VERPAKKING

Bedrijfsafval

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



4 000680 073604

Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie



IN GEVAL VAN NOOD:
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30-274 8888
In overige gevallen Bayer CropScience:
Binnen kantooruren: +31 (0)297-280307
Buiten kantooruren: +31 (0)6 -553 724 90

© is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep
Chargennummer: zie elders op de verpakking.

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358

Bayer



GEVAAR

NL00205952L