



 **decis**<sup>®</sup>

1 L

Insecticide

Toelatingsnr: 7774 N



ARTIKELNR.: 79548370

Productnaam: Decis EC

Werkzame stof: deltamethrin

Gehalte: 25 g/liter

Toelatingsnummer: 7774 N (W16)

Aard van het preparaat: emulgerbaar concentraat

Andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen:  
nfta, laagkookpunt, aromatisch.

**Gevarenaanduidingen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Voorzorgsmaatregelen**

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/  
gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water  
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen; indien mogelijk,  
blijven spoelen.

P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen  
(die eventueel contact kan opnemen met het  
Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (NVIC).

P331 GEEN braken opwekken.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval. Zie STORL.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid  
en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking.

Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar [www.dresscode.bayer.nl](http://www.dresscode.bayer.nl)



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld  
zoals wettelijk is voorgeschreven.

**IN GEVAL VAN NOOD:**

Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor  
professionele hulpverleners:  
Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum  
(NVIC) +31 (0)30-274 8888  
In overige gevallen Bayer CropScience  
+31 (0)6-553 724 90

UN 1993



NL79928238M




® is een geregistreerd handelsmerk  
van de Bayer Groep

Partijnummer/Productiedatum: zie separaat etiket

Bayer CropScience SA-NV  
Postbus 231  
3640 AE Mijdrecht  
Tel. 0297-280538

Bayer



GEVAAR

## **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

### **Algemeen advies:**

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

### **Inademing:**

De patiënt in de frisse lucht brengen en in een rustige omgeving houden. Onmiddellijk een arts raadplegen (**die evt. contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

### **Aanraking met de huid:**

Onmiddellijk met veel water en zeep gedurende minstens 15 minuten afwassen. Warm water kan de hevigheid van de irritatie/paresthesie subjectief verhogen. Dit is geen teken van een systemische vergiftiging. Bij huidirritatie een huidolie of huidlotion met Vitamine E gebruiken. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

### **Aanraking met de ogen:**

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Warm water kan de hevigheid van de irritatie/paresthesie subjectief verhogen. Dit is geen teken van een systemische vergiftiging. Kalmerende oogdruppels, eventueel verdovende oogdruppels toedienen. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

### **Inslikken:**

Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. GEEN braken opwekken. Slachtoffer niet alleen laten. Onmiddellijk een arts raadplegen (**die evt. contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

### **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

#### **Verschijnselen:**

Plaatselijk: Kan bij huid- en oog-contact mogelijk ernstige paresthesie veroorzaken. Dit effect is van voorbijgaande aard en meestal binnen 24 uur verdwenen, Irritatie van huid, ogen en slijmvlies, Hoesten, Niezen.

Systemisch: onbehaaglijk gevoel in de borst, Tachycardie, Hypotonie, Misselijkheid, Buikpijn, Diarree, Braken, Troebel zicht, Hoofdpijn, anorexia, Somnolentie, Coma, Stuiptrekkingen, Sidderingen, Prostratie, Hyperreactie van de luchtwegen, Longoedeem, Hartklopping, Musculaire fasciculatie, Apathie, Duizeligheid.

### **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

#### **Gevaren:**

Dit product bevat een pyrethroid. Een pyrethroid-vergiftiging moet anders behandeld worden als een of carbamaat- of organofosfaat-vergiftiging!

#### **Behandeling:**

Systemische behandeling: Behandel symptomatisch. Bewaken: ademhaling en hartfunctie. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Ademhalingswegen vrijhouden. Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling. Bij krampen een benzodiazepine (bijv. diazepam) in standaard doseringen geven. Als dit niet werkzaam is, phenobarbital geven. Contra-indicatie: atropine. Contra-indicatie: adrenaline derivaten. Een specifiek tegengif is niet bekend. Herstel volgt doorgaans spontaan zonder gevolgen.

Bij huidirritatie een huidolie of huidlotion met Vitamine E gebruiken.

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieeljust toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Pootaardappel	Gewasbehandeling	Kevers <sup>1</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per teeltcyclus	0,9 L/ha per teeltcyclus	14	7
		Bladluis (aardappelbladrolvirus = PLRV-virus) <sup>2</sup> , Bladluis <sup>4</sup>	0,4 L/ha	0,4 L/ha	2 per teeltcyclus		14	
		Bladluis (Y-virus) <sup>3</sup> , Bladluis <sup>4</sup>	0,2 L/ha	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus		7	
Consumptieaardappel	Gewasbehandeling	Kevers <sup>1</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per teeltcyclus	0,9 L/ha per teeltcyclus	14	7
		Bladluis <sup>4</sup>	0,2 L/ha	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus		7	
Zetmeelaardappel	Gewasbehandeling	Kevers <sup>1</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per teeltcyclus	0,9 L/ha per teeltcyclus	14	7
		Bladluis <sup>4</sup>	0,2 L/ha	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus		7	
Bieten	Gewasbehandeling	Trips <sup>5</sup> , rupsen <sup>6</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per teeltcyclus	0,3 L/ha per teeltcyclus	-	30
		Granen	Bladluis <sup>7</sup>	0,25 L/ha	0,25 L/ha	2 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	14
Teff	Gewasbehandeling	Bladluis <sup>7</sup>	0,25 L/ha	0,25 L/ha	2 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	14	30
Mais	Gewasbehandeling	Kevers <sup>9</sup>	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per teeltcyclus	1,0 L/ha per teeltcyclus	14	30
Peulvruchten (inclusief veldboon) met uitzondering van Lupine	Gewasbehandeling	Trips <sup>5,10,19</sup> , rupsen <sup>11</sup> , kevers <sup>9</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	2 per teeltcyclus	0,6 L/ha per teeltcyclus	14	7
Graszaadteelt m.u.v. veldbeemd (zaadteelt)	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen <sup>12</sup>	0,3 l/ha	0,3 l/ha	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	30 dagen tussen toepassing en maaien ten behoeve van voederdoeleinden
Veldbeemd (zaadteelt)	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen <sup>12</sup>	0,3 l/ha	0,3 l/ha	1 per 12 maanden	1,0 L/ha per 12 maanden	-	30 dagen tussen toepassing en maaien ten behoeve van voederdoeleinden
		Vliegen en muggen <sup>13</sup>	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden		14	
Blauwmaanzaad	Gewasbehandeling	Trips <sup>5, 14, 19</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per teeltcyclus	0,3 L/ha per teeltcyclus	-	60
Karwij	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>15</sup>	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	45
Vlas	Gewasbehandeling	Trips <sup>5,14,19</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per teeltcyclus	0,3 L/ha per teeltcyclus	-	60
Koolzaad	Gewasbehandeling	Kevers <sup>16,17</sup>	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	45
Bladrammenas	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>18</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per teeltcyclus	0,9 L/ha per teeltcyclus	14	7
Bladkool	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>18</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per teeltcyclus	0,9 L/ha per teeltcyclus	14	7
Veldboon	Gewasbehandeling	Trips <sup>5,10,19</sup> , rupsen <sup>11</sup> , kevers <sup>9</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	2 per teeltcyclus	0,6 L/ha per teeltcyclus	14	7
Stoppelknol	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>18</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per teeltcyclus	0,9 L/ha per teeltcyclus	14	7
Cultuur-grasland	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen <sup>12</sup>	0,3 l/ha	0,3 l/ha	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	30 dagen tussen toepassing en maaien ten behoeve van voederdoeleinden
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Trips <sup>5,14,19</sup> , rupsen <sup>5,20,21,22,23,24,34</sup> , kevers <sup>25</sup>	0,02% (20 ml /100 L water)	0,12 L/ha	2 per teeltcyclus	0,24 L/ha per 12 teeltcyclus	14	3
Aardbei (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Trips <sup>5,14,19</sup> , rupsen <sup>5,20,21,22,23,24,34</sup> , kevers <sup>25</sup>	0,02% (20 ml /100 L water)	0,2 L/ha	2 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	14	3
Aalbes (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>20,21,22,23,24,26,27</sup> , vliesvleugeligen <sup>28</sup> , wants <sup>29</sup>	0,02% (20 ml /100 L water)	0,24 L/ha	3 per teeltcyclus	0,72 L/ha per teeltcyclus	14	7
Kruisbes (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>20,21,22,23,24,26,27</sup> , vliesvleugeligen <sup>28</sup> , wants <sup>29</sup>	0,02% (20 ml /100 L water)	0,24 L/ha	3 per teeltcyclus	0,72 L/ha per teeltcyclus	14	7
Braam (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Kevers <sup>25,30</sup> , rupsen <sup>20,21,22,23,24,26,27</sup> , vliesvleugeligen <sup>31</sup> , wants	0,02% (20 ml /100 L water)	0,24 L/ha	3 per teeltcyclus	0,72 L/ha per teeltcyclus	14	7
Framboos (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Kevers <sup>25,30</sup> , rupsen <sup>20,21,22,23,24,26,27</sup> , wants	0,02% (20 ml /100 L water)	0,24 L/ha	3 per teeltcyclus	0,72 L/ha per teeltcyclus	14	7
Sla (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6,32,33,34</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	0,8 L/ha per 12 maanden	7	14
Sla (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6,32,33,34</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1,0 L/ha per 12 maanden	7	14
Peulgroenten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Trips <sup>5,10,19</sup> , rupsen <sup>11</sup> , kevers <sup>9</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	2 per 12 maanden	0,6 L/ha per 12 maanden	14	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 33, 35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , mineervlieg <sup>37</sup> , trips <sup>19</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,7 L/ha	3 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	7	3
Meloen	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 33, 35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , mineervlieg <sup>37</sup> , trips <sup>19</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,7 L/ha	3 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	7	3
Aubergine	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 33, 35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , mineervlieg <sup>37</sup> , trips <sup>19</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,7 L/ha	3 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	7	3
Tomaat	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 33, 35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , mineervlieg <sup>37</sup> , trips <sup>19</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,5 L/ha	3 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	7	3
Paprika	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 33, 35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , mineervlieg <sup>37</sup> , trips <sup>19</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,7 L/ha	3 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	7	3
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 32, 35, 37, 38</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	2 per 12 maanden	0,6 L/ha per 12 maanden	7	7
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 32, 35, 37, 38</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	14	7
Stengelkool (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 32, 35, 37, 38</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	7	7
Radis-achtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	14	7
Radis (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>	0,5 L/ha	0,5 L/ha	3 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	7	7
Knolraap	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	14	7
Koolraap	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	14	7
Uien	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>39</sup> , mineervlieg <sup>40</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	14	7
Sjalotten	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>39</sup> , mineervlieg <sup>40</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	14	7
Knoflook	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>39</sup> , mineervlieg <sup>40</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	14	7
Asperge (onbedekte teelt), mits toegepast na het steken	Gewasbehandeling	Kevers <sup>41</sup> , vliegen en muggen <sup>42</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	2 per 12 maanden	0,6 L/ha per 12 maanden	14	7
Prei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>39</sup> , mineervlieg <sup>40</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	14	7
Paddenstoelenteelt	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen <sup>43, 44</sup>	3 mL/ 100m <sup>2</sup>	3 mL/100m <sup>2</sup>	2 per 12 maanden	6 mL/ 100m <sup>2</sup> of 6 mL/m <sup>3</sup>	3 dagen voor de eerste vlucht en 3 dagen voor de tweede vlucht	3
	Ruimtebehandeling		3 mL/100m <sup>3</sup>	3 mL/100m <sup>3</sup>				
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. gladiol, tulp, lelie en hyacint (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56</sup> , mineervlieg <sup>37, 40</sup> , trips <sup>5,10,14,19,47</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , dopluis <sup>45</sup> , schildluis <sup>46</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,2 L/ha	3 per 12 maanden	0,6 L/ha per 12 maanden	7	-
Gladiol (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56</sup> , mineervlieg <sup>37, 40</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , dopluis <sup>45</sup> , schildluis <sup>46</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,2 L/ha	3 per 12 maanden	0,9 L/ha per 12 maanden	7	-
				0,3 L/ha	0,3 L/ha			
Tulp, hyacint, Lelie (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56</sup> , mineervlieg <sup>37, 40</sup> , trips <sup>5,10,14,19,47</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , dopluis <sup>45</sup> , schildluis <sup>46</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,2 L/ha	3 per 12 maanden	0,8 L/ha per 12 maanden	7	-
				0,4 L/ha	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	7	
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56</sup> , mineervlieg <sup>37, 40</sup> , trips <sup>5,10,14,19,47</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , dopluis <sup>45</sup> , schildluis <sup>46</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,5 L/ha	3 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	7	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Dopluis <sup>5</sup> , schildluis <sup>46</sup> , rupsen <sup>6, 32, 33, 35</sup> , mineervlieg <sup>37, 40</sup> , trips <sup>5,10,14,19,47</sup> , witte vlieg <sup>36</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,5 L/ha	3 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	7	-
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Dopluis <sup>5</sup> , schildluis <sup>46</sup> , rupsen <sup>6, 32, 33, 35</sup> , mineervlieg <sup>37, 40</sup> , trips <sup>5,10,14,19,47</sup> , witte vlieg <sup>36</sup>	0,05% (50 ml /100 L water)	0,5 L/ha	3 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup> , vliegen en muggen <sup>5,7,58</sup>	0,02% (20 ml /100 L water)	0,24 L/ha	3 per 12 maanden	0,72 L/ha per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup> , vliegen en muggen <sup>5,7,58</sup>	0,02% (20 ml /100 L water)	0,15 L/ha	3 per 12 maanden	0,45 L/ha per 12 maanden	7	-
Vaste plantenteelt	Gewasbehandeling	Rupsen <sup>6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup> , vliegen en muggen <sup>5,7,58</sup>	0,02% (20 ml /100 L water)	0,2 L/ha	3 per 12 maanden	0,6 L/ha per 12 maanden	7	-
Sportveld	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen <sup>2</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per 12 maanden	0,3 L/ha	-	30 dagen tussen toepassing en maaien ten behoeve van voederdoeleinden
Graszodenteelt	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen <sup>2</sup>	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per 12 maanden	0,3 L/ha	-	30 dagen tussen toepassing en maaien ten behoeve van voederdoeleinden

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1) Colorado kever ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )   | 19) Tabakstrips ( <i>Thrips tabaci</i> )   | 39) Preimot ( <i>Acrolepiopsis assectella</i> )              |
| 2) Bladluis ter voorkoming van persistent virus  | 20) Anjerbladroller ( <i>Cacoecimorpha pronubana</i> )                                       | 40) Uienmineervlieg ( <i>Liriomyza cepae</i> )               |
| 3) Bladluis ter voorkoming van non persistent virus  | 21) Azalea bladroller ( <i>Acleris laterana</i> )  | 41) Aspergekever ( <i>Crioceris asparagi</i> )               |
| 4) Aardappeltopluis ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ), Boterbloemluis ( <i>Aulorhynchum solani</i> ), Sjalotteluis ( <i>Myzus ascalonicus</i> ), Groene perzikluis ( <i>Myzus persicae</i> ) | 22) Brandnetelbladroller ( <i>Olethreutes lacunana</i> )                                     | 42) Aspergevlieg ( <i>Platyparea poeciloptera</i> )          |
| 5) Vroege akkertrips ( <i>Thrips angusticeps</i> )   | 23) Koolbladroller ( <i>Clepsis spectrana</i> )  | 43) Champignonvlieg ( <i>Megaselia halterata</i> )           |
| 6) Gamma uil ( <i>Autographa gamma</i> )   | 24) Agaatvlinder ( <i>Phlogophora meticulosa</i> )   | 44) Varenrouwmug ( <i>Sciariidae</i> )                       |
| 7) Grote graanluis ( <i>Sitobion avenae</i> ), Vogelkersluis ( <i>Rhopalosiphum padi</i> ), Roos-grasluis ( <i>Metopolophium dirhodum</i> )  | 25) Aardbeibloesemkever ( <i>Anthonomus rubi</i> )   | 45) Dopluizen ( <i>Coccidae</i> )                            |
| 8) Maiswordelboorder ( <i>Diabrotica virgifera</i> )   | 26) Vruchtbladroller ( <i>Adoxophyes orana</i> )   | 46) Schildluizen ( <i>Coccidae</i> )                         |
| 9) Bladrandkever ( <i>Sitona lineatus</i> )  | 27) Wintervlinder ( <i>Operopthera brumata</i> )   | 47) Gladiolentrips ( <i>Thaeniothrips simplex</i> )          |
| 10) Erwtentrips ( <i>Kakothrips robustus</i> )   | 28) Bessenbladwesp ( <i>Nematus ribesii</i> )  | 48) Bladluis ter voorkoming van non persistent virus         |
| 11) Erwtentpeulboorder ( <i>Laspeyresia nigricana</i> )  | 29) Groene appelwants ( <i>Lygus pabulines</i> )   | 49) Wintervlinder ( <i>Operopthera brumata</i> )             |
| 12) Rouwvlieg ( <i>Bibio marci</i> , <i>Bibio hortulanus</i> , <i>Dilophus febrillius</i> )  | 30) Frambozenkever ( <i>Byturus fumatus</i> )  | 50) Bastaardsatijnvlinder ( <i>Euproctis chryssorrhoea</i> ) |
| 13) Graszaadgalmug ( <i>Mayetiola</i> spp)   | 31) Bramemineerwesp ( <i>Metalus pumilus</i> )   | 51) Ringelrupsvlinder ( <i>Malacosoma Neustria</i> )         |
| 14) Vlas trips ( <i>Thrips linarius</i> )  | 32) Koolwitje ( <i>Pteris</i> spp)   | 52) Satijnvlinder ( <i>Leucoma salicis</i> )                 |
| 15) Karwijmot ( <i>Depressaria daucella</i> )  | 33) Groente-uil ( <i>Polia oleracea</i> )  | 53) Stippel en spinsel motten ( <i>Yponomeura</i> sp)        |
| 16) Koolzaadglanskever ( <i>Meigalites aeneus</i> )  | 34) Koolmotje ( <i>Plutella xylostella</i> )   | 54) De plakker ( <i>Lymantria dispar</i> )                   |
| 17) Koolzaadsnuitkever ( <i>Ceuthorrhynchus assimilis</i> )  | 35) Turksemot ( <i>Chrysoideixis calchites</i> )   | 55) Jeneverbesmineermot ( <i>Argyresthia trifasciata</i> )   |
| 18) Koolmot ( <i>Plutella xylostella</i> )   | 36) Koolwittevlieg ( <i>Aleyrodes proletella</i> )   | 56) Kastanmineermot ( <i>Cameraria ohridella</i> )           |
|  | 37) Bladmineerders ( <i>Liriomyza trifolii</i> , <i>L. huibrensis</i> , <i>L. bryoniae</i> ) | 57) Eikentopgalmug ( <i>Arnoldiola quercus</i> )             |
|  | 38) Late koolmot ( <i>Evergestis forvi-calis</i> )   | 58) Wilgentopgalmug ( <i>Rhabdophaga terminalis</i> )        |

## Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van:

- minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in de volgende teelten:

poot-, zetmeel en consumptieaardappelen, peulvruchten, veldboon, bladrammenas, bladkool, stoppelknollen, aalbes, kruisbes, braam, framboos, sla, peulgroenten, sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, koolaaip, knolraap, radijsachtigen, uien, sjalotten, knoflook, prei, asperge, bloembol- en bolbloemgewassen (met uitzondering van gladiool), vaste planten;

- minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in de teelt van boomkwekerijgewassen, waarbij geldt dat toepassing uitsluitend door middel van een neerwaartse bespuiting mag plaatsvinden;

- minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de volgende teelten:

mais, stengelkool, gladiool, bloemisterijgewassen.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels.

Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

## AANBEVELINGEN

### Attentie

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden in zowel de bedekte- als onbedekte teelt van groenten-, fruit-, sierteelt-, boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk om de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

### Definitielijst toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Producten/DTG>).

### Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is); werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

### Voorkomen emissie

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, verwerking restanten en reiniging machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science SA-NV, zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science SA-NV in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.