



EMESTO[®]
SILVER

5 L

Toelatingsnr. 14916 N

Knolbehandelingsmiddel



*Write
your own
success story!*

ARTIKELNR.: 80032889

Productnaam: Emesto Silver

Toelatingsnr.: 14916N (W1)

Werkzame stoffen: Penflufen, Prothioconazool

Gehalte: 100 g/L, 18 g/L

Aard van het preparaat:

Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling

Gevarenaanduidingen:

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208 Bevat prothioconazool, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on en mengsel van 5-chloor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

en 2-methyl-2H-isothiazol-3(2H)-on (3:1).

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval. Zie STORL.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Zaai- en plantgoedbehandelingsproducten bij voorkeur toepassen in een goed geventileerde ruimte of in de open lucht. Vermijd dat behandeld materiaal in aanraking komt met de huid.

Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar www.dresscode.bayer.nl




WAARSCHUWING




Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

IN GEVAL VAN NOOD:
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor
professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
(NVIC) +31 (0)30-274 8888
In overige gevallen Bayer CropScience
+31 (0)6-553 724 90

NL85836331B



4 000680 074939



UN3082

® is een geregistreerd handelsmerk
van de Bayer Groep

Partijnummer/Productiedatum:
zie separaat etiket

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358

Bayer

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging.

Inademing

In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts waarschuwen die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftings Informatie Centrum (NVIC)**.

Aanraking met de huid

Met veel water en zeep afwassen, indien voorhanden, met veel polythyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslikken

GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Onmiddellijk een arts waarschuwen die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftings Informatie Centrum (NVIC)**.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een pootgoedbehandeling tijdens de opslag in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Aardappelen	Rhizoctonia ¹ Zilverschurft ²	0,2 L/ ton pootgoed	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*) ² ZilverSchurft (*Helminthosporium solani*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Behandeld pootgoed mag niet voor menselijke of dierlijke consumptie worden aangewend.

Emesto Silver mag maximaal éénmaal per drie jaar op hetzelfde perceel worden toegepast.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

AANBEVELINGEN

Attentie

Emesto Silver is flexibel inzetbaar en kan worden toegepast vanaf de laatste keer (na)lezen tot vlak voor het poten van de aardappelen. Er zijn positieve ervaringen met de toepassing van Emesto Silver in het gevoelige ‘witte puntjes’ stadium.

Emesto Silver is een veilig middel wat zich vertaalt in goede opbrengsten. Wel kan Emesto Silver een trage opkomst, bijvoorbeeld door sterk verouderd of verzwakt pootgoed, iets versterken.

Zorg voor een snelle droging van de behandelde aardappelen, bij voorkeur met geforceerde ventilatie.

TOEGELATEN IN

Akkerbouwgewassen

Aardappel: pootaardappel, consumptie-aardappel, zetmeelaardappel

Vloeistof hoeveelheid bij toepassing: aanvullen met water tot 1 l, of maximaal 2 l vloeistof per ton aardappelen. Emesto Silver bij voorkeur toepassen door middel van een schijfvernevelaar, altijd in combinatie met een rollenband. Ook kan Emesto Silver worden toegepast met aardappeldouchemachines. Zorg voor een optimale bedekking van de knollen.

Mengingen met andere middelen

Emesto Silver niet mengen met Diabolo (of andere imazalil bevattende producten).

Voorkomen emissie

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals voorkomen van afspoeling, verwerking restanten en reiniging machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.