



REDIGO®

30 l

Schimmel- bestrijdingsmiddel ter ontsmetting van zaaizaad

Toelatingsnr: 13547 N



RESTERHULPMAATREGELING

Algemeen advies

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Inademing

In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Aanraking met de huid

Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglycol 400. Vervolgens reinigen met water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslippen

GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)). Mond spoelen.

Opmerkingen voor de arts

Behandeling

Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actieve kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een zaadbehandelings-toepassing (zaadcoating) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

TOEPASSINGS-VOORWAARDEN	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing
Wintertarwe	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	100 mL middel per 100 kg zaaizaad	0,22 L/ha
Wintergerst	Fusarium ¹ , sneeuw-schimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴ , strepenziekte ⁵	100 mL middel per 100 kg zaaizaad	0,18 L/ha
Winterrogge	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	100 mL middel per 100 kg zaaizaad	0,18 L/ha
Triticale	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	100 mL middel per 100 kg zaaizaad	0,18 L/ha
Zomertarwe	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	100 mL middel per 100 kg zaaizaad	0,22 L/ha
Zomergerst	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴ , strepenziekte ⁵	100 mL middel per 100 kg zaaizaad	0,18 L/ha
Zomerrogge	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	100 mL middel per 100 kg zaaizaad	0,18 L/ha
Haver	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	100 mL middel per 100 kg zaaizaad	0,18 L/ha

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Fusarium (*Fusarium culmorum*)

² Sneeuwschimmel (*Microdochium nivale*/ *Monographella nivale*)

³ Steenbrand (*Tilletia caries*/ *Tilletia tritici*)

⁴ Stuifbrand (*Ustilago nuda* f.sp. *tritici*/ *Ustilago segetum* var. *tritici*)

⁵ Steenbrand (*Ustilago hordei*/ *Ustilago segetum* var. *hordei*)

⁶ Stuifbrand (*Ustilago nuda* f.sp. *hordei*/ *Ustilago segetum* var. *nuda*)

⁷ Strepenziekte (*Pyrenophora graminea*)

⁸ Steenbrand (*Ustilago kolteri*/ *Ustilago hordei* f. sp. *avenae*)

⁹ Stuifbrand (*Ustilago avenae*/ *Ustilago segetum* var. *avenae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Met het middel behandeld zaaizaad mag niet worden bestemd voor menselijke en/of dierlijke consumptie. Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voerend is ondergewerkt. Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

AANBEVELINGEN

Attentie

Definitielijst toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgj, juni 2015). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Producten/DTG>)

Overige informatie


Het middel is uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik. Hoe schoner het zaad, des te beter zal de zaadontsmetting zijn. Redigo kan met de meest moderne ontsmettingsinstallatie in pure vorm worden toegepast maar kan ook worden aangevuld met een gewenste hoeveelheid water. Als het zaad stof bevat en/of de herverdeling matig is, kan de hoeveelheid water worden verhoogd tot 5 l/ton. Vanzelfsprekend verdient de behandeling met schoon zaaizaad de voorkeur.

Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.

De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.



ARTIKELNR.: 80958560

Productnaam: Redigo (W1)

Toelatingsnummer: 13547 N

Aard van het preparaat:
Suspensie Concentraat voor zaadbehandeling
Werkzame stof: Prothioconazole
Gehalte: 100 g/l

Gevenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

- Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.
- Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
- Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.
- Bewaren in originele container.
- Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden.
- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.
- Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt

Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar www.dresscode.bayer.nl

STORL
VERPAKKING
Bedrijfsafval

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

NL80893388G



IN GEVAL VAN NOOD:
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30- 274 8888
In overige gevallen: Bayer CropScience +31 (0)6-553 724 90

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358

Bayer



WAARSCHUWING