

## EERSTE HULP MAATREGELEN

### Algemeen advies

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

### Inademing

In de frisse lucht brengen.

Slachtoffer warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

### Aanraking met de huid

Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

### Aanraking met de ogen

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

### Inslikken

GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Geactiveerde houtskool innemen.

### Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

**Verschijnselen:** Irritatie van huid, ogen en slijmvlies

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

**Gevaren:** Hoewel een carbamaat, is dit product GEEN cholinesteraseremmer.

**Behandeling:** Symptomatisch behandelen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

Contra-indicatie: atropine.

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door een gewasbehandeling in de teelt van consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen.

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die fenamidone bevatten maximaal zes keer per jaar toepassen. Indien het middel bij opeenvolgende behandelingen wordt ingezet, dient het na drie toepassingen te worden afgewisseld met een middel met een ander werkingsmechanisme tegen *Phytophthora infestans*.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing middels een luchtvaartuig niet toegestaan op percelen die grenzen aan oppervlaktewater.

### Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 7 dagen voor consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Algemeen

Consento bevat de werkzame stoffen propamocarb-hydrochloride en fenamidone.

Het middel is werkzaam op het plantoppervlak, waar het infectie voorkomt. Daarnaast werkt Consento door lokaal-systemisch gedrag ook in de plant, waar het schimmelgroei remt.

Om de werking van Consento optimaal te benutten dient het middel preventief te worden ingezet. Zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden. Hoeveelheid water per ha: 200-400 liter.

### Toepassingen

Consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen, ter voorkoming van aantasting door de aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van gewasontwikkeling, infectiedruk, weersomstandigheden en ras.

De bespuitingen daarna herhalen met een interval van 7 dagen.

De dosering is afhankelijk van infectiedruk, weersomstandigheden en ras.

De hoogste dosering kiezen als de omstandigheden voor de ontwikkeling van de ziekte gunstig zijn.

**Dosering:** 1,67-2,0 l/ha.

### Voorkomen emissie:

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer CropScience vanuit ProductStewardship om spuitapparatuur of andere machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, overdekt te stallen en deze te reinigen op een overdekte was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid, om puntbelasting naar het oppervlaktewater te voorkomen. Was-, spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten gewas of een perceel kunnen worden uitgereden dienen te worden verwerkt in een PhytoBac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

### Opslag en verwijdering

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking. Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.

### Verbod hergebruik verpakking

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

**BAYER**

**CONSENTO**

10 L Fungicide

Toelatingsnr. 12859 N (W2)

**Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen**

**ARTIKELNR.: 80967985**

**Productnaam:** Consento

**Toelatingsnr.:** 12859 N - W2

**Werkzame stoffen:**

fenamidone & propamocarb hydrochloride

**Gehalte:** 75 g/l, 375 g/l

**Aard van het preparaat:** suspensie concentraat

### Gevarenaanduidingen

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### Voorzorgsmaatregelen

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelput voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Bevat Propamocarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar [www.dresscode.bayercropscience.nl](http://www.dresscode.bayercropscience.nl)**

**STORL**  
VERPAKKING  
Bedrijfsafval

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

UN 3082



© is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Chargennummer: zie elders op de verpakking

**HOLLAND FYTO**  
kwaliteit beweegt ons!

Bayer CropScience SA-NV  
Postbus 231  
3640 AE Mijdrecht  
Tel. 0297-280618

**Bayer**