



REDIGO[®] PRO

1000 I

Toelatingsnr: 13548 N

Schimmelbestrijdingsmiddel ter ontmetting van zaai­zaad

EENS TERHULPMAAK REGELLEN

Algemeen advies: Buiten de gevaarlijke zone brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Ligging en vervoer het slachtoffer in stabiele zijligging.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.

Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.

Aanraking met de huid: Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglycol 400. Vervolgens reinigen met water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslikken: GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen. Mond spoelen.

Opmerkingen voor de arts

Behandeling: Symptomatisch behandelen. Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als een grotere hoeveelheid ingeslikt is, medicinale houtskool en natrium-sulfaat geven. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van zaadbehandelings­toeslag (zaadcoating) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitief toepassingsgebieden versie 2.1 C1pb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

TOEPASSINGS­VOORWAARDEN

TOEPASSINGS­VOORWAARDEN	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing
Wintertarwe	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ^{4,5} , penicillium ⁶	67 mL middel per 100 kg zaai­zaad	0,15 L/ha
Wintergerst	Sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	67 mL middel per 100 kg zaai­zaad	0,12 L/ha
Winterrogge	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	67 mL middel per 100 kg zaai­zaad	0,12 L/ha
Triticale	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	67 mL middel per 100 kg zaai­zaad	0,12 L/ha
Zomertarwe	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴ , penicillium ⁶	67 mL middel per 100 kg zaai­zaad	0,12 L/ha
Zomergerst	Sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	67 mL middel per 100 kg zaai­zaad	0,12 L/ha
Zomerrogge	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ⁴	67 mL middel per 100 kg zaai­zaad	0,12 L/ha
Haver	Fusarium ¹ , sneeuwschimmel ² , steenbrand ³ , stuifbrand ^{4,5}	67 mL middel per 100 kg zaai­zaad	0,12 L/ha

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

- ¹ Fusarium (*Fusarium culmorum*)
- ² Sneeuwschimmel (*Microdochium nivale*/ *Monographella nivalis*)
- ³ Steenbrand (*Tilletia caries*/ *Tilletia tritici*)
- ⁴ Stuifbrand (*Ustilago nuda* f.sp. *tritici*/ *Ustilago segetum* var. *tritici*)
- ⁵ Stuifbrand (*Ustilago avenae*/ *Ustilago segetum* var. *avenae*)
- ⁶ Penicillium (*Penicillium* spp.)
- ⁷ Steenbrand (*Ustilago hordei* f.sp. *hordei*/ *Ustilago segetum* var. *hordei*)
- ⁸ Stuifbrand (*Ustilago nuda* f.sp. *hordei*/ *Ustilago segetum* var. *nuda*)
- ⁹ Steenbrand (*Ustilago kolleni*/ *Ustilago hordei* f. sp. *avenae*)
- ¹⁰ Steenbrand (*Ustilago hordei*/ *Ustilago segetum* var. *hordei*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Met het middel behandeld zaai­zaad mag niet worden bestemd voor menselijke en/of dierlijke consumptie. Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt;

zorg ervoor dat het product ook op de kopaker is ondergewerkt.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u omgruopen product verwijderen.

AANBEVELINGEN

Attentie

Definitief toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Producten/DTG>)

Overige informatie

Het middel is uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik. Hoe schoner het zaad, des te beter zal de zaadontsmetting zijn. Redigo Pro kan met de meest moderne ontsmettingsinstallatie in pure vorm worden toegepast maar kan ook worden aangevuld met een gewenste hoeveelheid water. Als het zaad stof bevat en/of de herverdeling matig is, kan de hoeveelheid water worden verhoogd tot 5 l/ton. Vanzelfsprekend verdient de behandeling met schoon zaai­zaad de voorkeur.

Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste richtlijn.

De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

ARTIKELNR.: 79976097

Productnaam: Redigo Pro (W1)
Toelatingsnummer: 13548 N

Aard van het preparaat:

Suspensie Concentraat voor zaadbehandeling

Werkzame stof: Prothioconazole en Tebuconazole

Gehalte: 150 g/l en 20 g/l

Gevenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval. Zie AgriRecover
SP1 Zorg dat u met product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

- Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.
- Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.
- Bewaren in originele container.
- Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden.
- Verwijder houden van eet- en drinkwaren en diervoer.
- Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.




Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

www.agrirecover.eu



WAARSCHUWING

UN 3082



NL85800612C



4 000680 074762

Chargenummer: zie elders op de verpakking.

® is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358



IN GEVAL VAN NOOD:
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30- 274 8888
In overige gevallen: Bayer CropScience +31 (0)6-553 724 90