



# BATAVIA<sup>®</sup>

## 1 L

### Insecticide



ARTIKELNR.: 86201011

**Productnaam:** Batavia

**Toelatingsnummer:** 15615 N (W3)

**Werkzame stof:** spirotetramat

**Gehalte:** 100 G/L

**Aard van het preparaat:** Suspensie concentraat

**Voorzorgsmaatregelen:**

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.  
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen:**

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval.  
Zie STORL  
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen:**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.**

**Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.**

**Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.**



**WAARSCHUWING**



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven

UN 3082



86208288B



8 712171 948167

**IN GEVAL VAN NOOD:**

**Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30-274 8888  
In overige gevallen Bayer CropScience +31 (0)6-553 724 90**

© is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep  
Partijnummer/Productiedatum: zie elders op de verpakking

Bayer CropScience SA-NV  
Postbus 231  
3640 AE Mijdrecht  
Tel. 0297-280358

Bayer

## **ERSTEHULPMAATREGELEN:**

### **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

#### **Algemeen advies**

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

#### **Inademing**

In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan opnemen met met **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

#### **Aanraking met de huid**

Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

#### **Aanraking met de ogen**

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen.

Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

Medische hulp invoeren als irritatie optreedt en aanhoudt.

#### **Inslikken**

Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan opnemen met met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

### **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

#### **Verschuinselen**

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

### **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

#### **Behandeling**

Symptomatisch behandelen.

Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen.

Een specifiek tegengif is niet bekend.

**WETTELIIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**
**WETTELIIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardappel	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>1, 2, 3, 24, 26</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	4 per teeltcyclus	7	14
Appel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>5, 7, 8, 9</sup> appelbloedluis <sup>10</sup>	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,8 L/ha	2 per 12 maanden	14	21
Peer (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>5, 8, 11, 12, 13</sup> bladvlo <sup>14</sup>	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,8 L/ha	2 per 12 maanden	14	21
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling (toepassing 14 dagen voor bloei, danwel na-oogst)	bladluis <sup>1, 20, 22, 24, 26, 28-31</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	-
Sla <i>Lactuca</i> spp. (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup> wortelluis <sup>19</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Sla <i>Lactuca</i> spp. (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	wortelluis <sup>19</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Andijvie (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Spinazie m.u.v. klaroen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Spinazie-achtigen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20, 21, 22, 23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Veldsla (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Uien (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips <sup>32</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	4 per teeltcyclus	7	7
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>1, 4, 21, 22, 24, 26</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	4 per teeltcyclus	14	-
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>1, 21, 22, 24, 26, 37</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	6 per 12 maanden	14	-
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>1, 21, 22, 24, 26, 37</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>1, 4, 21, 22, 24, 26</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	2 per teeltcyclus	14	-
Bloemisterijgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>22</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	6 per 12 maanden	14	-
Bloemisterijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>22</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	2 per 12 maanden	14	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>1, 4, 21, 22, 24, 26</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	2 per 12 maanden	14	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>1, 21, 22, 24, 26, 37, 38</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	6 per 12 maanden	14	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>1, 21, 22, 24, 26, 37, 38</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	bladluis <sup>1, 21, 22, 24, 26, 27</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	-
Vaste plantenteelt (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>1, 21, 22, 24, 26, 27</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	6 per 12 maanden	14	-
Vaste plantenteelt (bedekte, grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>1, 21, 22, 24, 26, 27</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

- 1 Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*)
- 2 Wegedoornluis (*Aphis nasturtii*)
- 3 Vuilboomluis (*Aphis frangulae*)
- 4 Fluitekruidluis (*Dysaphis anthrisci*)
- 5 Kleine bramenluis (*Aphis ruborum*)
- 6 Appelgrasluis (*Rhopalosiphum insertum*)
- 7 Bloedvlekkenluis (*Dysaphis devecta* en *D. anthrisci*)
- 8 Roze appelluis (*Dysaphis plantaginea*)
- 9 Groene appeltakluis (*Aphis pomi*)
- 10 Appelbloedluis (*Eriosoma lanigerum*)

11. Roze pereluis (*Dysaphis pyri*)
12. Vouwgalluis (*Anuraphis farfarae*)
13. Zwarte perenluis (*Melanaphis pyraia*)
14. Perenbladvlv (*Psylla pyri*)
15. Zwarte kersenluis (*Myzus cerasi*)
16. Groene kortstaartluis (*Brachycaudus helichrysi*)
17. Melige perzikluis (*Hyalopterus amygdali*)
18. Melige pruimenluis (*Hyalopterus pruni*)
19. Wollige slaworteluis (*Pemphigus bursarius*)
20. Groene slaluis (*Nasanovia ribisnigri*)

21. Groene perzikluis (*Myzus persicae*)
22. Katoenluis (*Aphis gossypii*)
23. Bruine slaluis (*Uroleucon sonchi*)
24. Zwarte bonenluis (*Aphis fabae*)
25. Gevlekte kortstaartluis (*Brachycaudus prunicola*)
26. Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*)
27. Gele rozenluis (*Rhodobium porrosum*)
28. Groene melkdistelluis (*Hyperomyzus lactucae*)
29. Grote frambozenluis (*Amphorophora idaei*)
30. Aardbeiknotshaarluis (*Chaetosiphon fragaefolii*)

31. Sjalottenluis (*Myzus ascalonicus*)
32. Tabakstrips (*Thrips tabaci*)
33. Braamgrasluis (*Sitobion fragariae*)
34. Grote bramenluis (*Amphorophora rubi*)
35. Bessentakluis (*Rhopalosiphonius ribesinus*)
36. Kleine frambozenluis (*Aphis idaei*)
37. Staticobium limonii (*Staticobium limonii*)
38. Beukenbladluis (*Phyllaphis fagi*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van kers, pruim, druif, braam- en framboosachtigen, andijvie (bedekt), waterkers, veldsla (bedekt), rucola, lamsoor, kiemgroenten, baby leaves, Chinese kool, sjalotten, aromatische kruidgewassen en medicinale kruidgewassen en veredelings- en zaadteelt is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aanemelijk tegen	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Kers (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>15</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	1,1 L/ha	2 per 12 maanden	14	21
Pruim (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>16,17,18</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	1,1 L/ha	2 per 12 maanden	14	21
Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>21</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	14
Braam- en framboosachtigen ( <i>Rubus</i> spp.) (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de oogst	bladluis <sup>5,25,28,29,33-36</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	-
Andijvie (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Waterkers (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Veldsla (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Rucola	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Lamsoor (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Kiemgroenten	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Baby leaves	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Chinese kool (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	3
Sjalotten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips <sup>32</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	4 per teeltcyclus	7	7
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Aromatische kruidgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling voor de bloei	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	bladluis <sup>20-23</sup>	0,75 L/ha	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling na de bloei	bladluis <sup>1,21,22,24,26,27</sup>	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	2 per 12 maanden	14	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

- 1 Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*)
- 2 Wegedoornluis (*Aphis nasturtii*)
- 3 Vuilboomluis (*Aphis frangulae*)
- 4 Fluitekruidluis (*Dysaphis anthrisci*)
- 5 Kleine bramenluis (*Aphis ruborum*)
- 6 Appelgrasluis (*Rhopalosiphum insertum*)
- 7 Bloedvlekkenluis (*Dysaphis devecta* en *D. anthrisci*)
- 8 Roze appelluis (*Dysaphis plantaginea*)
- 9 Groene appeltakluis (*Aphis pomi*)
- 10 Appelbloedluis (*Eriosoma lanigerum*)

11. Roze pereluis (*Dysaphis pyri*)
12. Vouwgalluis (*Anuraphis farfarae*)
13. Zwarte perenluis (*Melanaphis pyraia*)
14. Perenbladvlv (*Psylla pyri*)
15. Zwarte kersenluis (*Myzus cerasi*)
16. Groene kortstaartluis (*Brachycaudus helichrysi*)
17. Melige perzikluis (*Hyalopterus amygdali*)
18. Melige pruimenluis (*Hyalopterus pruni*)
19. Wollige slaworteluis (*Pemphigus bursarius*)
20. Groene slaluis (*Nasanovia ribisnigri*)

21. Groene perzikluis (*Myzus persicae*)
22. Katoenluis (*Aphis gossypii*)
23. Bruine slaluis (*Uroleucon sonchi*)
24. Zwarte bonenluis (*Aphis fabae*)
25. Gevlekte kortstaartluis (*Brachycaudus prunicola*)
26. Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*)
27. Gele rozenluis (*Rhodobium porrosum*)
28. Groene melkdistelluis (*Hyperomyzus lactucae*)
29. Grote frambozenluis (*Amphorophora idaei*)
30. Aardbeiknotshaarluis (*Chaetosiphon fragaefolii*)

31. Sjalottenluis (*Myzus ascalonicus*)
32. Tabakstrips (*Thrips tabaci*)
33. Braamgrasluis (*Sitobion fragariae*)
34. Grote bramenluis (*Amphorophora rubi*)
35. Bessentakluis (*Rhopalosiphonius ribesinus*)
36. Kleine frambozenluis (*Aphis idaei*)
37. Staticobium limonii (*Staticobium limonii*)
38. Beukenbladluis (*Phyllaphis fagi*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Behandelde medicinale kruidgewassen alleen gebruiken voor homeopathische of medicinale doeleinden.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Voor bedekte teelten geldt dat gebruik wel is toegestaan op bloeiende planten, mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door bijvoorbeeld alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen/terrestrische planten te beschermen is toepassing van dit middel in hoge laanbomen (>5 meter) uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT50, dan wel een teeltvrije zone van 500 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelsrand) in acht wordt genomen.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

#### Gevoeligheid gewassen

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, vaste plantenteelt en boomkwekerijgewassen en de verschillen in gewasverdraagzaamheid, verdient het aanbeveling om alvorens het middel toe te passen een proefbespuiting uit te voeren.

Na de proefbespuiting 14 dagen wachten om vast te stellen of een bespuiting van het middel gewaseffecten veroorzaakt.

Het middel niet toepassen in Salix (Salicaceae).

#### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof spirotetramat. Spirotetramat behoort tot de acetyl CoA carboxylase remmers. De IRAC code is 23. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

## AANBEVELINGEN

### Algemeen

Batavia is een volledig systemische insecticide, behorend tot de groep van de keto-enolen. Het werkingsmechanisme berust op de verstoring van de aanmaak van lipiden en daarmee de verstoring van onder andere de aanmaak van vetten en celmembranen van insecten. Hierdoor is er geen kruisresistentie met insecticiden uit andere groepen dan uit de keto-enolen en is Batavia dus een uitstekend middel in resistentie-management strategieën. Batavia wordt opgenomen in de plant en zowel via bast als houtvaten (tweezijdig systemisch) door de gehele plant naar boven én naar beneden getransporteerd. Door deze unieke eigenschap zullen ook jonge onbehandelde bladeren, moeilijk bereikbare delen van de plant én het wortelgestel van de plant uitstekend beschermd zijn. Batavia heeft een zeer brede werking, en is effectief tegen een zeer breed spectrum van zuigende insecten. Op volwassen insecten kan de werking onvoldoende zijn omdat deze nauwelijks voedsel opnemen en minder vetten aanmaken.

### TOEGELATEN IN

Definitielijst toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (http://agro.bayer.nl/Producten/DTG)

### Belangrijke informatie voor een optimale toepassing

Cruciaal voor een optimale werking van Batavia is de opname door en het transport in de plant.

Pas Batavia daarom alleen toe als:

- het gewas krachtig groeit, en dus niet op een verouderend of in stress verkerend gewas
- er voldoende blad aanwezig is.

Batavia bestrijdt diverse soorten zuigende insecten, waaronder bladluizen, wortelloozen, wortelvlooiën, bladluizen, dop- en schildluis, wolluis, wittevlieg en tripsen.

De aanvangswerking is traag. Indien gespoten wordt op een populatie ingekrulde bladluizen zal pas na 7 tot 14 dagen werking zichtbaar zijn. Bij voorkeur spuiten op een beginnende bladluispopulatie, voordat er zich koloniën hebben ontwikkeld.

### Belangrijke informatie voor specifieke gewassen

#### Appel, peer, kers en pruim

- In deze teelten Batavia uitsluitend toepassen met minimaal 1000 ltr water per hectare

- Batavia niet gemengd spuiten met fungiciden, insecticiden of (blad)meststoffen.

- Indien nog geen ervaring met dit middel is opgedaan in een bepaald gewas of cultivar, voer dan altijd eerst een proefbespuiting uit.

Na de proefbespuiting 14 dagen wachten om vast te stellen of een bespuiting van het middel gewaseffecten veroorzaakt.

#### Vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen

Batavia toepassen met minimaal 300 liter water per hectare.

#### Bloemisterij- en boomkwekerijgewassen

**Niet toepassen** in de teelt van **Anthurium** vanwege mogelijk ernstige huidreacties.

**Niet toepassen in de volgende teelten**, vanwege mogelijke schade aan het gewas:

Alstroemeria, Begonia, Cyclamen, Euphorbia, Ficus, Hedera, Hydrangea, Impatiens, Pelargonium, Salix, Saintpaulia

#### Bloembollen

Het toepassen van Batavia in de teelt van tulpen kan in de nateelt mogelijk leiden tot een versterking van het optreden van verkleavingsverschijnselen. Beperk dit risico door onderstaande maatregelen aangaande aantal toepassingen, spuitinterval en wachttijd tot andere bespuitingen in acht te nemen.

- Maximaal 2 bespuitingen in tulp uitvoeren, met een minimaal interval van 14 dagen.
- De eerste toepassing binnen 1 week na de bloei uitvoeren.
- Batavia niet gemengd toepassen
- Batavia toepassen met minimaal 300 liter water per hectare
- Batavia niet toepassen in een schema waar ook minerale olie en/of grassenmiddelen in worden toegepast.
- De wachttijd tussen een voorafgaande bespuiting en de daarop volgende Batavia toepassing is bij insecticiden en fungiciden 2 dagen en bij herbiciden (excl. grassenmiddelen) 5 dagen, bij een bespuiting na de Batavia toepassing geldt voor insecticiden en fungiciden een wachttijd van 2 dagen en voor herbiciden (excl. grassenmiddelen) een wachttijd van 3 dagen. Ondanks het nadrukkelijk naleven van de spelregels is het optreden van verkleving in bloembollen of bloemknollen niet uit te sluiten. Overleg daarom zowel met uw afemer als leverancier over het wel of niet inzetten van Batavia in de teelt.

#### Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Buitenteelten: Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Binnenteelten: Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Tijdens gewaswerkzaamheden, oogsten/snijden en sorteren/verpakken geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen.

#### Voorkomen emissie

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.