



# Folicur<sup>®</sup>

3 kg

Fungicide



**ARTIKELNR.: 2770192**

**Productnaam:** Folicur

**Toelatingsnummer:** 11765 N - W9

**Werkzame stof:** tebuconazool

**Gehalte:** 25%

**Aard van het preparaat:** water dispergeerbaar granulaat

**Professioneel gebruik**

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: tebuconazool

**Gevarenaanduidingen**

H361 Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

**Voorzorgsmaatregelen**

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval.

Zie STORL

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.**

**Droog, koel en achter slot bewaren.**

**Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.**



**WAARSCHUWING**

**UFI: 9S80-T05H-V00G-9QGY**

**STORL**

**VERPAKKING**

**Bedrijfsafval**

**Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.**

Werkingswijze

GROUP

**3**

FUNGICIDE

NL85421484H



4 000680 057772

**UN 3077**



**IN GEVAL VAN NOOD:**

**Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor**

**professionele hulpverleners:**

**Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum**

**(NVIC) +31 (0)88 755 8000**

**In overige gevallen Bayer CropScience**

**+31 (0)6-553 724 90**

® is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Chargenummer:

zie elders op de verpakking.

Bayer CropScience SA-NV

Postbus 88

2130 AB Hoofddorp

Tel. 023-7991095

**Bayer**

## Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

**Inademing:** In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

**Aanraking met de huid:** Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water.

**Aanraking met de ogen:** Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp invoeren als irritatie optreedt en aanhoudt.

**Inslikken:** Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

## Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

**Verschijnselen:** Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

## Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.

**Behandeling:** Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Appel	Meeldauw <sup>1</sup>	0,034% (34 g in 100 liter water)	0,5 kg/ha	2	21	14
Peer	Meeldauw <sup>1</sup>	0,034% (34 g in 100 liter water)	0,4 kg/ha	2	21	14
Kers	Tak- en bloesemsterfte <sup>2</sup> , vruchtrot <sup>3</sup>	0,05% (50 g in 100 liter water)	0,75 kg/ha	2**	21	7
Pruim	Tak- en bloesemsterfte <sup>2</sup> , vruchtrot <sup>3</sup>	0,05% (50 g in 100 liter water)	0,75 kg/ha	2**	21	7
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	Vuur <sup>4</sup>	0,55 kg/ha	0,55 kg/ha	1	-	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

\*\* Eerste toepassing BBCH 57-69, tweede toepassing BBCH 71-85

<sup>1</sup> Meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

<sup>2</sup> Tak- en bloesemsterfte (*Monilia laxa*)

<sup>3</sup> Vruchtrot (*Monilia fructigena*)

<sup>4</sup> Vuur (*Botrytis* spp.)

Het gebruik in de teelt van koolzaad is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepas-

sing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Koolzaad	Spikkelziekte <sup>5</sup>	1 kg/ha	2	21	56

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>5</sup> Spikkelziekte (*Alternaria* spp.)

### Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van tulp, zantedeschia, hyacinth, fijnbollige narcis en lelie het middel toepassen vanaf bladvorming (BBCH 12). In de overige bloembol- en bloemknolgewassen het middel toepassen vanaf de bloei (BBCH 50).

Voor opwaartse veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van appel, peer, kers en pruim uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater het middel verspoten wordt met een Venturidop, waarbij de laatste bomerij éézijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van koolzaad uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% drift reducerende spuitdoppen.

### Resistentiemanagement:

Dit middel bevat de werkzame stof tebuconazool. Tebuconazool behoort tot de triazolen. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

## AANBEVELINGEN

### Attentie

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden in teelt van fruit-, en siergewassen is het onmogelijk om de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

## TOEGELATEN IN

### Definitielijst toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.0 (Ctgb, juni 2011). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het be-

treffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Producten/DTG>).

## **Belangrijke informatie voor specifieke gewassen**

### **Appel, peer**

Nectria: de meeste aantasting komt in de herfst tot stand, wanneer tijdens de bladval wondjes ontstaan. Pas vanaf 20% bladval 1 á 2 bespuitingen Folicur gecombineerd met een bedekkingsfungicide toe. Folicur werkt zowel preventief als curatief op deze schimmel.

Stemphylium: pas Folicur na de bloei gecombineerd met een bedekkingsfungicide met een interval van 21 dagen twee keer toe.

### **Kers, Pruim**

Voor de bestrijding van tak- en bloesemsterfte (*Monilinia laxa*) de eerste bespuiting uitvoeren vlak na het schuiven van de knoppen. De behandeling kort na de bloei herhalen.

Voor de bestrijding van vruchtrot (*Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena* en *Botrytis*) ongeveer 30 dagen voor de oogst een bespuiting uitvoeren.

De bestrijding van roest in pruimen starten zodra de eerste vlekjes worden waargenomen. Deze bespuiting met een interval van 21 dagen herhalen.

### **Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding**

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

### **Overige informatie**

#### **Voorkomen emissie**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science, zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

#### **Folicur afmeten met een maatbeker**

Algemeen: 140 ml = ca. 100 gram

Bollen: 850 ml = ca. 600 gr = 1 ha